

## Uses Continued

developing around structures in warm months, a quarterly application around the perimeter and to harborage areas. If the perimeter is treated with a repellent insecticide (eg. pyrethroid), the bait may still be used around the perimeter, but it should be applied in a band outside the repellent barrier for best results. **Turf Application:** Apply bait even over the affected area using a hand shaker or mechanical spreader rate of 113–226g/100sqm or 4.5-9kg/4000sqm. The product should not be watered in. For mole cricket treatments, results will be best if the area is irrigated prior to bait treatment. Apply bait evenly over the affected area using a hand shaker or mechanical spreader rate of 113–226g/100sqm, or 4.5-9kg/4000sqm. The product should not be watered in. For mole cricket treatments, results will be best if the area is irrigated prior to bait treatment. **Sewer Application:** Apply bait at a rate of 28g/10sqm along ledges inside sewers and around manhole cover. **Indoor Application:** Apply bait only in areas inaccessible to children and pets, or in tamper-resistant bait stations. Use a hand shaker or duster to apply bait. Apply up to 14g per crack, crevice or void, or at a rate of 14g per 1sq meter. Trash closets, utility closets, dropped ceilings, under and behind appliances and vending machines, in wall voids and voids under and behind cabinets, sinks and tubs, in drawer wells, garbage chutes, pipe chases, elevator pits, around drains, around electrical conduits and in cracks and crevices where insects may harbor.

## PRECAUTIONARY STATEMENTS

احفظه بعيدا عن متناول الأطفال تحذير: خطر للإنسان والحيوانات الأليفة

**Hazards to Humans and Domestic Animals: CAUTION.** Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet.

## First Aid

يسبب تهيج متوسط للعين ، تجنب ملامسته للعين والملابس ، غسل العينين والوجه جيدا بالماء والصابون بعد الاستخدام غسل العينين بالماء الجاري لمدة ١٥-١٠ دقيقة استشر طبيب للحاجه و مرفق ملصق المبيد

**IF IN EYES:** -Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. -Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing. Have the product container or label with you when calling a doctor or going for treatment.

## STORAGE AND DISPOSAL

**Pesticide Storage:** Store in a dry place. Do not store where children or animals may gain access. **Container Handling:** Non-refillable container: **If empty:** Do not use or refill this container. Place in trash or offer for recycling if available.

يخزن في مكان جاف و بارد بعيد عن الأطعمة والحيوانات لا تعيد استخدام العبوة مره أخرى . تخلص من العبوة في أماكن النفايات و إعادة التدوير

**Valid for 3 years from production date.**

**P/Date:**

**Batch No:**

# InVict X PRESS granular bait

**Kills Roaches, Ants\*, Crickets, Mole Crickets, Silverfish, Firebrats, and Earwigs**

**Multiple Food Attractants • For Indoor, Outdoor and Turf Use**



المادة الفعالة : إيميداكلوبريد.....0.5%  
Other Ingredients:.....99.5%  
مواد أخرى: .....%٩٩,٥  
المجموع: .....%١٠٠  
Total:.....100.0%

**Stop - Read Label Before Use**

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN  
CAUTION**

Manufactured by:

**Rockwell Labs Ltd**  
creating the future of pest control

Made in the USA

**ecovag**

Distributed by:

إيكوفار للتجارة  
هاتف: 97143663302  
www.ecovargroup.com  
دبي، الإمارات العربية المتحدة

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**  
يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال  
Ministry of climate change and environment  
Registration Number  
رقم التسجيل بوزارة التغير المناخي والبيئة

**DXB-AD-140-2278014**

Net Contents: 455g

## DIRECTIONS FOR USE

## طريقة الاستخدام

طعم محبب متعدد ، للإستخدام الداخلي والخارجي والحدائق. يقتل الصراصير والنمل وحشرة السمك الفضي وحشرة صرصور الليل وحشرات متعددة الطيف . يمكن استخدامه في كل الأماكن السكنية هو التجارية والتعليمية والعلاجية والفنادق والحدائق والمباني العامة وأماكن تواجد الحيوانات والمستودعات وحول نباتات الزينة والمثمرة ونوادي الغولف والبيوت البلاستيكية.

**Use Sites:** In and around structures, including homes, apartments, commercial, industrial, municipal, institutional, research, recreational, healthcare, educational, daycare, hospitality and agricultural buildings and other man-made structures, garages, transport vehicles, sewers, animal research facilities, and food service, storage, handling and processing establishments. Turf sites include lawns, landscape beds, ornamental turf, parks, playing fields, right-of-ways, golf course greens and tee boxes, and home greenhouses.

## USES

## الإستخدامات

معدل التطبيق الخارجي: استخدم 30-15 غم لكل 100 قدم مربع عن طريق النثر المباشر أو استخدام معدات تطبيق خاصة بالنثر ، ويجب ان يكون مواقع المعاملة بعيدة عن المبني من ٣-٢ قدم، يمكن استخدام المبيد حول محطات طعم الفئران للتغذية على الحشرات الزاحفة ، ضع 30-15 غم على كل خلية نمل، ضع في شقوق الأشجار لمكافحة النمل، يمكن استخدامه في محطات طعم خاصة للحشرات الزاحفة ، لضمان عدم عودة الإصابة و توالد حشرات جديدة ينصح بتكرار المعاملة كل ثلاث شهور بعد انتهاء الإصابة معدل التطبيق في أماكن النباتات والمساحات الخضراء: استخدم 240-120 غم لكل 1000 قدم مربع ، يجب عدم وصول المياه الري للمبيد معدل التطبيق في مجاري الصرف الصحي: استخدم 30 غم لكل 100 قدم مربع في حواف المنهل وعلى غطاء المنهل معدل التطبيق الداخلي: استخدم 15 غم لكل 100 قدم مربع أو لكل شق استخدمه في أماكن غير مكشوفة للأطفال خلف المعدات المنزلية، في الشقوق، خلف أسرة النوم، على رفوف غير مكشوفة للأطفال خلف المعدات المنزلية، في الشقوق، الحشرات، كرر المعاملة بعد أسبوع في حالة وجود أصابه متبقية معدلات تطبيق خاصة في داخل فتحات مصادر الكهرباء توضع في داخل صندوق الكهرباء، في داخل كيبان المطبخ يوضع في الشقوق والفتحات بين الكيبان والرفوف في أماكن تحضير الطعام يجب وضع الطعوم فقط داخل الشقوق والفتحات وعدم وضعه على الأسطح المكشوفة

**Outdoor Perimeter Application:** Apply bait at a rate of 14–28g per 10sq meter. Use a hand shaker, duster or mechanical spreader to apply the bait. Apply in a band from 1m wide around the perimeter of buildings. Also apply around exterior light fixtures and along the edges of sidewalk, patios and driveways and under decks. Pay particular attention to potential insect harborage sites, apply bait at the more liberal application rate in these areas. In home greenhouses, apply bait on and under benches. Do not pile the bait in exposed areas. The bait may also be sprinkled in and around rodent bait stations to control insects that harbor in these stations. When treating for ants\*, apply 14–28g of bait around ant mounds and sprinkle along foraging trails. For ants\*, pay particular attention to harborage areas and apply bait around trees and stumps, in tree cavities, in and around firewood piles, around landscaping stones and in mulch beds. Ants\* can take the bait back to the nest and kill the colony. Bait may also be applied in insect bait stations. Reapply bait after one week if infestation is still present. To prevent large insect populations from

Size: 5.8125" x 8.5"