

PRECAUTIONARY STATEMENTS

تحذيرات

توصيات في حالات التسمم أو التوحد:
يحتوي الملتصق على مادة مضادة للتخثر. يمكن أن تظهر الأعراض في حالة الابتلاع بحتمل في غضون ٧٢ ساعة. إن تسمم الحيوانات السوربية يترك من الألف واللاثة، ويمكن أن يكون هناك خدمات موجوده مده في البول أو البراز في حالات التسمم الشديده.

RECOMMENDATIONS IN CASES OF INTOXICATION OR ACCIDENT:

This product contains an anticoagulant substance. In case of ingestion, symptoms can become evident within up to 72 hours. Clinical manifestations may include bleeding from the nose and gums. In severe cases, there may be bruising and the presence of blood in feces or urine.

إجراءات الإسعافات الأولية

تعرض الجلد للملصق. اغسل البشرة بالماء، و ثم بالصابون والماء تعرض العينين للملصق. تحقق دائماً من العدسات والزايا. واتسعل العينين بغسول أو بالماء وابق العينين مفتوحين على الأقل لمدة ١٠ دقائق. تعرض الدم للملصق. غسل الدم جيداً بالمطهر مضمناً للشخص. فاقط الدم. واتسعل على التيقظ. اطلب المشورة الطبية عند الابتلاع وابق على الملصق أو العبوة في متناول اليد. اتصل بطبيب بيطري في حالة ابتلاعها من قبل حيوان الريف إن هذا المنتج خطير بالنسبة إلى الحياة البرية. الترياق المعاد. فيما بين ك ١.

صحة عاجية للطيء وموظفي الصحة

في حالة الحوادث، اتصل بخدمات معلومات السموم الطبية.

FIRST AID MEASURES IN CASE OF:

- Dermal exposure, wash the skin with water and then with soap and water.
- Eye exposure, always check for contact lenses and remove, rinse eyes with eyewash or water, keep eyes open for at least 10 minutes.
- Oral exposure, rinse mouth thoroughly with water. Do not give anything by mouth to an unconscious person. Do not induce vomiting. If swallowed, seek medical advice, keep the label or container close at hand and consult the TOXICOLOGICAL.

INFORMATION SERVICE. Contact a vet in case a pet ingests it. Dangerous for wildlife. ANTIDOTE: VITAMIN K1 (Fitemenadiona)

THERAPEUTIC ADVICE FOR DOCTORS AND HEALTH PERSONNEL:
IN CASE OF ACCIDENT, CONSULT THE TOXICOLOGICAL INFORMATION MEDICAL SERVICE.

التخزين والتخلص من العبوات

التخزين: قم بحفظ المبيد في العبوات الأصلية بعيداً عن الأطفال وفي مكان محكم وليس لتخزين الطعام والشراب للحيوانات وأيضاً بعيداً عن الحرارة والرطوبة والضوء. الألف. لا تلتف المبيد في البنية وفي حالة العبوات الفارغة أو المبيد غير المستخدم والمنتمية لصاحبة يجب تحويل مركز إدارة نفايات مرضى حسب قوانين إدارة النفايات المحلية.

STORAGE AND DISPOSAL

Keep the product in the original packaging & out of reach of children in a locked room which is not used for storing food, drinks or animal feeding stuffs. protect the product from heat, light & humidity. Do not deposit baits in the environment. Hand empty packaging remains of unused product or if the storage life has expired, to an authorized collector of waste or waste remover. Act in accordance with waste & waste packaging management regulations.

MAXIRAT PLUS BLOQUE 5.0

READY TO USE RODENTICIDE BAIT

مكعبات ماكسيرات بلاس ٥.٠ مبيد للقوارض جاهز للإستخدام

المبيد مقيد الاستخدام
يبعه وأستخدامه فقط بواسطة فنيين مرخصين
أو من قبل أشخاص تحت إشرافهم المباشر

RESTRICTED USE PESTICIDE
For retail sale to and use only by certified Applicators
or Persons under their direct supervision

High Temperature 10g Block up to 65°C



COMPOSITION

Brodifacoum	0.005%
Bittering agent	0.001%
Excipients up to	100%

رقم التسجيل بوزارة التغير المناخي والبيئة
Moccaa Registration Number

DXB-AD-140-1929802

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال
Keep out of Reach of Children

Country of origin: Spain

Distributed By:

ecovar
Ecovar Trading L.L.C
Tel: +971 43663302
www.ecovargroup.com
Dubai, UAE

Agrochem

LABORATORIOS AGROCHEM
S.L. Tres Rieres, 10, 08292 Esparraguera - Spain
Tel. +34 93 777 48 53; Fax. +34 93 777 50 59
www.agrochem.es

Quantity: 5 Kg
Batch No: QM-92794
Production Date: 06/2025
Expiry Date: 06/2025

بلد المنشأ: إسبانيا

الشركة الموزعة:

ecovar
إيخوفار للتجارة (ش.م.ع)
هاتف: +971 43663302
دبي، الإمارات العربية المتحدة

الكمية: ٥ ك غ
رقم التشخيصية:
تاريخ الإنتاج:
تاريخ الإنتهاء:

المواصفات

إن مكعبات ماكسيرات بلاس، ٥.٠ هي مبيد للقوارض جاهز للاستخدام مصنوع من مادة مضادة للتخثر المعروفة باسم بروديفاكوم وهو فعال ضد القوارض والقوارض بعد تناولها مرة واحدة. أستخدمها في الأماكن الداخلية والخارجية ومسحات الحشم وقنات المجاري والمخاض المصحى. تتلاف التركيبة من مكعب شمع خالص ومستنسخ للغاية لجميع أنواع القوارض. لا يند المبتج أو يندر اشتباهه أفراد مستعمرات القوارض. ويحتوي مكعبات ماكسيرات بلاس، ٥.٠ على مادة كيميائية تمنع أفعال استهلاك الحظون من قبل الأطفال.

CHARACTERISTICS

MAXIRAT PLUS 5.0 BLOQUE is a ready to use rodenticide bait based on an anticoagulant substance known as Brodifacoum, effective against mice and rats after a single ingestion. Apply indoor & outdoor, in bait stations, manholes & sewer systems. The formulation consists in a wax block particularly attractive and palatable to all species of rodents. The product does not alarm and does not suspect the other members of the population of rodents. MAXIRAT PLUS 5.0 BLOQUE contains a bittering agent to prevent accidental ingestion by children.

وسائل الأستخدام

للموظفين المحترفين المختصين

يستخدم مكعبات ماكسيرات بلاس، ٥.٠ من قبل الموظفين المحترفين المختصين فقط داخل المباني والبنيات الخفية والمنتقنة الأولية السكنية والمنشآت الزراعية على سبيل المثال (في صناديق موزع عليها علامة بشكل صحيح).

مقدار جرعة الأستخدام

الجرذان
٢- ١ غرام في كل نقطة من صناديق الطعام
علي أن تفصل مسافة ١٠ أمتار بين كل نقطة مع
تجنب استخدام المواد الكيميائية في المنطقة
الخاصة بالمعالجة. انقل النفاط بعد مرور ٧-١
أيام إلى الأماكن التي تنتشر القوارض فيها.

القطران
٢- ٤ غرام في كل نقطة من صناديق الطعام على أن
تفصل مسافة ٤ أمتار بين كل نقطة وأن تفصل المنطقة
بعد يومين إلى ثلاثة أيام لزيادة فعالية المبيد.

MEANS OF APPLICATION:

FOR SPECIALISED PROFESSIONAL PERSONNEL:

The product MAXIRAT PLUS 5.0 BLOQUE applied by specialised professional personnel shall only be located inside buildings and fixed or mobile installations (e.g.: home buildings, farm facilities...) in correctly labelled bait boxes.

APPLICATION DOSE:

Mice
Bait boxes with 10 - 40g of product every point with distance of 5 meters between each station and relocate the station after 2-3 days to increase the treatment efficiency

Rats
Bait boxes with 20 - 60g of product every point with distance of 10 meters between each station and avoid using other chemicals in the treated area. After 7-10 days relocate the stations to more infested areas.

شروط محددة للأستخدام والتوزيع

عند الأستخدام في الأماكن الداخلية، أزل روائز المبتج بعد لعاية العملية. اتبع التعليمات الإضافية الواردة في دليل الممارسات الجيدة. عند الأستخدام حول الأبنية بالخارجة أذكر في الأعلى. أحرص على حماية الطعام من الظروف الجوية (على سبيل المثال المطر والتلج الخ.). مع رف الطعام في مناطق لا تتعرض للمسول. تمل الطعام التي تصرتت بسبب الماء، أو تلوثت بالتراب. عند الأستخدام في نظام الصرف الصحي وقنات المجاري.

الجرذان:

١- ١- ٤ غرام (حتى ٦ غراماً) في حالات التفتيش الشديده) من المكعبات في كل موقع في المباني المتاحه لضمان عدم الجرافها. نتقد استهلاك الطعام بالنظام وأستبدل المستهلك والغاسد منها حتى يتوقف الأستهلاك. كبر العملية في الحالات التي تدل على وجود تفتش جديد.

SPECIFIC CONDITIONS OF DEPLOYMENT/USE:

When used indoors: Remove the excess product at the end of the treatment. Follow the additional instructions provided by the Good Practice Manual. When used around buildings: In addition to all the above, protect the baits from atmospheric conditions (eg: rain, snow, etc). Place the bait rack in areas not subject to flooding. Replace baits that have been damaged by water or contaminated by dirt. When used in sewers systems and manholes: Rats: Secure 10 - 20 grams (up to 60gm with high infestation) of blocks per station to available structures to ensure the blocks are not washed away. Regularly check bait consumption and replace consumed or spoilt bait until consumption has stopped. Repeat treatment in situations where there is evidence of new infestation.